

Anesthésie générale :

Risques et effets secondaires

Chaque personne est différente et il n'est pas possible de savoir à l'avance qui sera affecté par un effet secondaire ou un risque. Certains risques et effets secondaires sont plus fréquents chez les personnes ayant des problèmes de santé existants ou ayant besoin de certaines interventions chirurgicales.

Les chiffres ci-dessous sont des moyennes tirées d'études de recherche. Les personnes ayant participé aux études ont généralement subi une intervention chirurgicale de routine, avaient un poids sain et ne présentaient pas de problèmes de santé spécifiques.

Vous pouvez consulter la recherche que nous avons utilisée à l'adresse suivante : www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

Vos risques peuvent être plus élevés ou plus faibles que les chiffres indiqués ci-dessous. Votre anesthésiste discutera avec vous des risques qu'il ou elle estime les plus probables ou importants dans votre cas.

De plus amples informations sur les différents types d'anesthésie sont disponibles en plusieurs langues sur notre site internet à cette adresse : www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.


Ces chiffres proviennent d'un échantillon de 100 personnes.

Quels symptômes ont été rapportés ?	Pendant combien de temps ?	Par combien de personnes ? Sur 100 personnes (cent personnes)
 Frissons	Pendant 20 à 30 minutes en salle de réveil	 15 concernées 85 non concernées
 Nausées (envie de vomir)	Pendant 1 à 24 heures	 Environ 15 concernées Environ 85 non concernées
 Maux de gorge	Pendant 24 à 48 heures	 20 à 40 concernées 60 à 80 non concernées <small>Dépend du type de sonde endotrachéale utilisée</small>

	Hématomes ou douleurs provoqués par les injections.	Disparaissent en quelques jours		10 concernées	90 non concernées
	Légère blessure à la lèvre ou à la langue	Guérit en quelques jours		1 à 5 concernées	95 à 99 non concernées
	Infection thoracique	Pendant quelques jours ou semaines		20 concernées	80 non concernées
	État de confusion (delirium postopératoire)	Pendant quelques jours, semaines ou mois		10 à 50 concernées	50 à 90 non concernées

Les risques ci-dessous sont rares.

Ces chiffres proviennent d'un échantillon de 10 000 personnes.

Quels symptômes ont été rapportés ?	Pendant combien de temps ?	Par combien de personnes ? Sur 10 000 personnes (dix mille personnes)
 Dommages aux dents	Nécessitent de consulter un dentiste	5 concernées 9 995 non concernées
 Vision trouble, irritation ou douleur oculaire liées à une petite égratignure ou une sécheresse oculaire.	Quelques jours	Environ 5 concernées Environ 9 995 non concernées
 Fourmillements, engourdissement, douleurs ou faiblesse (lésions nerveuses).	Temporaires (de quelques semaines à quelques mois) Permanents	1 à 5 concernées 9 995 à 9 999 non concernées 1 concernée 9 999 non concernées
 Réaction allergique grave (choc anaphylactique)	Survient rapidement Traitée immédiatement	1 concernée 9 999 non concernées
 Arrêt cardiaque c.-à-d. arrêt du cœur pendant l'intervention chirurgicale	Traitée immédiatement	3 concernées 9 997 non concernées

Ces chiffres proviennent d'un échantillon de 100 000 personnes.

Quels symptômes ont été rapportés ?		Par combien de personnes ? Sur 100 000 personnes (cent mille personnes)	
	Réveil de courte durée pendant l'anesthésie générale (réveil préopératoire)	5 concernées	99 995 non concernées
		3 à 4 personnes sur 100 000 ont déclaré que le réveil avait duré moins de cinq minutes, avant le début de l'intervention chirurgicale ou après celle-ci.	
		Environ 1 personne sur 100 000 a déclaré avoir ressenti de la douleur.	
	Perte de la vue (sont devenues aveugles) en raison d'une pression ou de caillots sanguins affectant le nerf optique.	1 concernée	99 999 non concernées
	Décès dû à des complications chirurgicales	14 concernées	99 986 non concernées
	Décès dû à un arrêt cardiaque pendant ou juste après l'intervention chirurgicale	1 concernée	99 999 non concernées
	Décès dû à l'anesthésique	1 concernée	99 999 non concernées
	Ce risque est très variable. Par exemple, il est plus élevé pour certaines interventions chirurgicales et chez les personnes fragiles, âgées ou présentant certains problèmes de santé.		

Décharge de responsabilité

Nous nous efforçons de maintenir l'exactitude et la mise à jour des informations contenues dans cette brochure, mais nous ne pouvons le garantir. Veuillez noter que ces informations générales ne peuvent pas répondre à toutes vos questions ni couvrir tous les sujets qui pourraient vous intéresser. Nous vous invitons donc à discuter de vos choix et de vos préoccupations avec votre équipe médicale, en vous aidant de cette brochure. Cette brochure ne doit pas être considérée comme un avis. Elle ne peut être utilisée à des fins commerciales ni professionnelles. Pour consulter l'intégralité de la clause de non-responsabilité, veuillez cliquer sur le lien suivant : (www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/french).

Toutes les traductions sont réalisées par la communauté de traducteurs de Traducteurs sans frontières. La qualité de ces traductions est vérifiée afin de les rendre aussi précises que possible, mais des inexactitudes ou des erreurs d'interprétation sont possibles pour certaines informations.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Cette brochure peut être copiée dans le but de produire du matériel d'information pour les patients. Veuillez citer cette source originale. Si vous souhaitez utiliser une partie de cette brochure dans une autre publication, une mention appropriée doit être fournie et les logos, marques, images et icônes doivent être supprimés. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.