

Загальна анестезія:

Ризики та побічні ефекти

Усі люди різні, тому неможливо передбачити, чи виникнуть побічні ефекти та ризики для здоров'я у конкретної людини. Деякі з них частіше зустрічаються у людей, які мають певні захворювання або потребують певного хірургічного втручання.


Наведені нижче цифри — це середні показники, отримані в результаті досліджень. Людям, які брали участь у дослідженнях, зазвичай була призначена планова хірургічна операція. Вони мали здорову вагу і не страждали на специфічні захворювання.

Про дослідження, які ми використовували, можна дізнатися тут:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks/evidence.

У вашому випадку ризики для здоров'я можуть бути вищими або нижчими за ці показники. Лікар-анестезіолог обговорить з вами ризики, які він вважає найбільш вірогідними або серйозними для вас.

Більше інформації про різні типи анестезії ви можете знайти на нашому сайті, який доступний різними мовами за посиланням:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/translations#languages.

Ці показники розраховані на кожні 100 осіб.

Який симптом виник?	Як довго він тривав?	Скільки випадків? У розрахунку на кожні 100 осіб (сто осіб)
 Тремтіння	Протягом 20–30 хвилин у палаті післяопераційного спостереження	 15 — так 85 — ні
 Нудота	Протягом 1–24 годин	 Близько 15 — так Близько 85 — ні
 Біль у горлі	Протягом 24–48 годин	 20–40 — так 60–80 — ні Залежить від типу використовуваної дихальної трубки
 Синці або біль від ін'єкцій	Зникають через кілька днів	 10 — так 90 — ні

	Незначне пошкодження губ чи язика	Загоюється за кілька днів		1–5 — так	95–99 — ні
	Інфекція дихальних шляхів	Протягом декількох днів або тижнів		20 — так	80 — ні
	Марення (делірій)	Протягом декількох днів, тижнів або місяців		10–50 — так	50–90 — ні

Наведені нижче ризики для здоров'я зустрічаються рідко.

Ці показники розраховані на кожні 10 000 осіб.

Який симптом виник?	Як довго він тривав?	Скільки випадків? У розрахунку на 10 000 осіб (десять тисяч осіб)	
 Травма зубів	Потребує відвідування стоматолога	5 — так	9995 — ні
 Погіршення зору, подразнення або біль в очах через маленьку подряпину або сухість в очах	Кілька днів	Близько 5 — так	Близько 9995 — ні
 Поколювання, оніміння, біль або слабкість (пошкодження нервів)	Тимчасово (декілька тижнів або місяців)	1–5 — так	9995–9999 — ні
	Постійно	1 — так	9999 — ні
 Сильна алергічна реакція (анафілаксія)	Розвивається швидко Підлягає негайному лікуванню	1 — так	9999 — ні
 Зупинка серця, наприклад, під час операції	Підлягає негайному лікуванню	3 — так	9997 — ні

Ці показники розраховані на кожні 100 000 осіб.

Який симптом виник?	Скільки випадків? У розрахунку на 100 000 осіб (сто тисяч осіб)
 Пробудження на короткий час під час загальної анестезії (непередбачене повернення до тями)	5 — так 99 995 — ні 3–4 особи з кожних 100 тисяч повідомили, що це тривало менше п'яти хвилин до операції або після її завершення. Приблизно 1 особа з кожних 100 тисяч повідомила, що відчувала певний біль.
 Втрата зору (сліпота) через тиск або тромби, що можуть уразити зоровий нерв	1 — так 99 999 — ні
	Смерть від ускладнень після операції 14 — так 99 986 — ні
	Смерть внаслідок зупинки серця під час або одразу після операції 1 — так 99 999 — ні
	Смерть внаслідок дії анестезувального засобу 1 — так 99 999 — ні Показники цього ризику сильно коливаються. Наприклад, цей ризик може бути вищим для певних операцій. Це також стосується людей з ослабленим здоров'ям, похилого віку чи з певними хронічними захворюваннями.

Відмова від відповідальності

Ми доклали максимум зусиль, щоб інформація в цій брошурі була вичерпною та актуальною, але ми не можемо цього гарантувати. Ми не очікуємо, що ця загальна інформація охопить усі питання, які можуть виникнути у вас, або все, що може бути важливим для вас. Ви повинні обговорити свій вибір і будь-які ваші занепокоєння з вашою медичною бригадою, використовуючи цю брошуру як посібник. Саму по собі цю брошуру не слід розглядати як пораду. Цю брошуру не можна використовувати для будь-яких комерційних чи бізнес-цілей. Щоб отримати повну інформацію про відмову від відповідальності, натисніть тут: (www.rcoa.ac.uk/patient-information-translations-ukrainian).

Усі переклади надає спільнота перекладачів Translators without Borders. Якість цих перекладів перевіряється, щоб зробити переклади максимально точними, але існує ризик неточностей і неправильного тлумачення деякої інформації.

www.rcoa.ac.uk

patientinformation@rcoa.ac.uk

© 2024 Royal College of Anaesthetists (RCoA)

Ці відомості можуть бути скопійовані з метою створення інформаційних матеріалів для пацієнтів. Будь ласка, цитуйте першоджерело. Якщо ви бажаєте використати частину цієї інформації в іншій публікації, будь ласка, надайте відповідне посилання та видаліть логотипи, брендинг, зображення й піктограми. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами.